

Salgótarján Ebrendészeti telep

Üzemeltetési és Állategészségügyi Szabályzata

2020. június

*Készítette: Szőkéné Hajdú Diána
Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök
Felülvizsgálta: Feketéné Sörös Erika
Okl. kertészmérnök*



*Jóváhagyta: Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató*

Tartalomjegyzék

I. Általános adatok.....	3
I.1. Telep rövid leírása, bemutatása.....	3
II. Létesítmény betelepítési terve.....	4
III. Látogatási szabályzat.....	6
IV. Állattartási szabályzat.....	7
IV. 1. Etetési program.....	7
IV. 1. 1. A kutya emésztés-élettani sajátosságai.....	7
IV. 1. 2. A kutya táplálóanyag szükségleti normái.....	8
IV. 2. Etetési forma.....	10
IV. 3. Itatás rendszere.....	11
V. Megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás.....	12
V. 1. Ektoparaziták elleni védekezés.....	12
V. 1. 1. Atkák, kullancsok.....	13
V. 1. 2. Bolhák.....	13
V. 1. 3. Tetvek.....	14
V. 2. Endoparaziták.....	14
V. 3. Teendő kutyaharapás esetén.....	17
VI. Karantén módja, ideje és az elkülönítés előírásait.....	18
VII. Állatok szökésének megakadályozása, veszélyes egyedek tartásának szabályai.....	18
VIII. Ebrendészeti telep dokumentációs rendszere.....	20
IX. Állatok tartásának, gondozásának szabályai.....	21
X. Tápok, eledelék tárolásának szabályai.....	23
XI. Állati tetemek, állati hulladékok, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módja.....	23
XII. Állatok tartási helyeire, valamint a tárolóhelyek takarításának, tisztításának és fertőtlenítésének eszközei, anyagai és módja.....	24
XII. 1. Elkülönítő, karantén épület.....	25
XII. 2. Részben fedett, falkaszerű elhelyezést biztosító kennel.....	25
X. Mellékletek.....	28

I. Általános adatok

Ebrendészeti telep tulajdonosa: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tulajdonos címe: 3100 Salgótarján Múzeum tér 1.

Tulajdonos elérhetősége: 32/417-255

Ebrendészeti telep üzemeltetője: VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

Ebrendészeti telep címe: 3104 Salgótarján, Hrsz.: 0331/5

(Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep területe)

Üzemeltető székhelye: 3100 Salgótarján Kertész út 2.

Üzemeltető tel. száma: 32/440-366

Üzemeltető felelős vezetője: Fekete Zoltán ügyvezető igazgató

Üzemeltető e-mail címe: vgu@vgu.hu

Ebrendészeti telep közvetlen felelős vezetője:

Feketéné Sörös Erika

(VGÜ Nonprofit Kft. – kommunális részleg)

Tel. száma: 32/440-366

Ebrendészeti tevékenységgel megbízott vállalkozás: Karancs Mentőkutyás Alapítvány

Vezetője: Herczeg Zoltán

0670-376-9873

Ebrendészeti telep elérhetőség tel.száma: 32/511-025

Állatgondozói tevékenységgel megbízott dolgozó: Botos Zoltán 06-70-376-98-72

Megbízott állatorvos: dr. Ottmár György

I.1. Telep rövid leírása, bemutatása

Salgótarján város közigazgatási területéről begyűjtött gazdátlan, kóbor kutyák átmeneti elhelyezése, megőrzése céljából ebrendészeti telep került kialakításra.

A telep elhelyezése Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep alkalmas helyszín , állandó őrzése biztosított, körülkerített, kiépített infrastruktúrával rendelkezik.

A létesítmény a hulladéklerakó telep portaépület mögötti területén található.

II. Létesítmény betelepítési terve

Napjainkban a városias életforma elterjedésével számos közegészségügyi probléma került felszínre, melyet a fenntartható fejlődéssel összhangban orvosolni kell.

Urbánus területeken közegészségügyi gondot okoz a gazdátlan kóbor állatok kérdése, melyek begyűjtéséről, átmeneti megőrzéséről, valamint összhangban az 1998. évi XXVIII. számú állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előírásaival mielőbbi gazdához juttatásáról gondoskodni kell, annak érdekében, hogy helyhiány miatt minél kevesebb állatot keljen elaltatni.

Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 43. §-a értelmében:

„A települési önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik a település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével vagy ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztető betegség tüneteit mutató vagy betegsége gyanús kóbor ebek kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról”.

A fentiekben foglalt feladatokat Salgótarján Megyei Jogú Város vonatkozásában megbízási szerződés keretében, a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el, melynek keretében ebrendészeti szolgálatot tart fenn és ebrendészeti telepet és emellett menhelyet üzemeltet.

A kóbor állatok begyűjtésére részben lakossági észrevételek útján (telefonon, elektronikus úton, levélben történő bejelentések), részben a Polgármesteri Hivatal tájékoztatása alapján kerül sor.

A kóbor kutyák begyűjtését a ebrendész végzi. A telepre való beszállítással egyidejűleg pontos adminisztráció készül (a kutya fajtájáról, becsült koráról, a begyűjtés időpontjáról és helyéről, az állat habitusáról, a begyűjtés okáról, valamint az egyed látható sérüléseiről, egészségügyi állapotáról).

Ha a kutya begyűjtésére kóros agresszivitása miatt került sor (esetleg embert harapott) az egyed az elkülönítőbe kerül, megakadályozva ezáltal a fajtatársakkal, illetve a telep gondozóival, való összeverekedést. Minden ilyen esetben az elkülönítő ajtaján feltüntetésre kerül a „Veszélyes! Embert harapott!” feliratú tábla is a megfelelő tájékoztatás érdekében.

A veszettségi megfigyelés alatt lévő állatok ketrecének bejáratánál: „Vigyázat, megfigyelés alatt lévő állatok!” feliratú tábla kerül kifüggesztésre.

Az ebrendész, a telep felelős vezetője, egyaránt rendelkezik szükséges általános egészségügyi ismeretekkel, melynek nyomán betegségekre utaló jel (különös tekintettel az emberre veszélyes zoonózisokra (emberre veszélyes fertőzések, amelyek természetes úton terjedhetnek át gerinces állatokról, kutyákról az emberre) észlelése esetén szintén a karantén kennelben helyezik el a kutyát, gondoskodva a mielőbbi lehetőleg azonnali, illetve 24 órán belüli állatorvosi megfigyelésről, „kivizsgálásról”.

A beteg kutyák további elhelyezéséről az állatorvos dönt.

Barátságos, falkában élni tudó állatok mintegy 40 férőhelyes részbe kerülnek betelepítésre, ivar és testméret szerint elkülönítve. (a szaporulat elkerülése érdekében)

A falkában történő behelyezést követően folyamatosan nyomon követik az állatok közötti együttélés rendjét, a falkán belüli rangsor észlelése esetén a sérült, beilleszkedni nem tudó egyedeket” kiemelik” és egyedi elhelyezéséről gondoskodnak.


Az állatok megfigyelésére kiemelt hangsúlyt helyeznek, hiszen beteg, illetve agresszív kutyák örökbefogadásának lehetőségét- a későbbi, akár jelentősebb problémák (pl. ember elleni támadások) elkerülése érdekében-ki kívánják zárni.

Kölyök, valamint idősebb, legyengült egyedeket szintén külön helyezik el a zárható kennelekben.

Az ebrendészeti telepen őrzött állatok egészségügyi állapota kiemelt fontosságú mind humán-egészségügyi, mind állati járványügyi, epidémiás szempontból.

A fentiekben leírtakkal összhangban a telepre beszállított kutyák általános egészségügyi állapotát megbízott állatorvos vizsgálja meg legkésőbb a beszállítást követő 2 munkanapon belül; (pl. veszettség gyanú) a vizsgálatra azonnal, illetve 24 órán belül sort kerítve.

Betelepítési tervet az alábbi sematizált ábra szemlélteti:



III. Látogatási szabályzat

Az ebrendészeti telep Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep portaépület mögötti területén került kialakításra.

A telep folyamatos, 24 órás őrzése biztosított.

A telepen belül szakszemélyzet (a begyűjtésre kerülő állatok gondozását végző személyek) munkanapokon reggel 9 órától, délután 13 óráig tartózkodnak, ezen időtartam alatt a megőrzött állatok megtekintésére a szakszemélyzet kíséretével kerülhet sor.

Délutáni időszakban és munkaszüneti napokon a felelős vezető ill. KMA vezetőjének előzetes engedélyével (a hulladéklerakó porta személyzetének egyidejű tájékoztatásával) lehetséges a kutyák látogatása, a telepre érvényes főbb munkautasítások betartása mellett, kizárólag a telepi szakszemélyzet, és előre egyeztetett időpontban kíséretével.

Az állatok szemrevételezése során a telepre belépők kötelesek valamennyi érvényben lévő munkautasítást betartani, a felelős személyek, dolgozók iránymutatásait követni; a befogott állatok szabadba engedésétől; elzárt helyekre, kennelekbe történő belépéstől tartózkodni.

Látogatási rend

09⁰⁰ - 12³⁰ – folyamatosan (kizárólag a szakszemélyzet kíséretével)

14⁰⁰ – tól - egyedi esetekben a felelős vezető, ill KMA vezetőjének engedélyével (az érvényes munkautasítások betartásával), előzetesen leegyeztetett időpontban.

IV. Állattartási szabályzat

IV. 1. Etetési program

IV. 1. 1. A kutya emésztés-élettani sajátosságai

A kutya monogastriкус állat, ragadozó, a húsevők csoportjába tartozik. Egyszerre viszonylag nagy mennyiségű táplálékot képes elfogyasztani (feltehetően az ősök miatti periodikus táplálkozási lehetőségre visszavezethetően alakult ki). A kutya gyomra igen nagy és tágulékony (telt állapotban eléri az alsó hasfalat). Beleinek hossza testtömegéhez, illetve a növényevő állatokéhoz viszonyítva rövid, ezen ok miatt a kutya koncentrált, magas energiatartalmú tápot, táplálékot igényel.

A táplálék bélrendszeren keresztüli áthaladása viszonylag rövid időtartamot, mintegy 24-36 órát igényel, a rövid időtartamra tekintettel már viszonylag kismértékű emésztési zavarok is jelentős mértékben ronthatják a táplálékanyagot felszívódását, hasznosulását. A tápadagok összeállítása során nem csupán azok kémiai összetételét, hanem azok emészthetőségét is figyelembe kell venni.

A kutya a mindenevő állatokhoz hasonlítva több fehérjét és zsírt igényel, de szénhidrátokra is szüksége van.

A táplálékfelvétel módja szinte azonos a farkasok és a kutyák esetében, akár szilárd, akár folyékony eleségfélésegről van szó. Általában állva eszik, farkát lefelé lógatja és kanál alakúra formált nyelvvel lefetyeli a folyékony ételt vagy vizet. Szilárd táplálék esetében a kisebb falatokat metszőfogaikkal veszik fel és alaposabb rágás nélkül nyelik le. A nagy darabokat az elülső lábaikkal rögzítik és –fejüket oldalra fordítva – tépő fogaikkal szétszaggatják.

IV. 1. 2. A kutya táplálóanyag szükségleti normái

A kutya – ma még nem teljes körűen ismert – táplálóanyag szükségleti normáit, alapvetően kétféle módon fejezik ki. Egyrészt a kutyatáp táplálóanyag koncentrációját, másrészt a kutya napi táplálóanyag-igényét szokták megadni. A kutyatáp táplálóanyag koncentrációját jellemzően szárazanyag-tartalomra vonatkoztatva szokták meghatározni. A napi táplálóanyag szükségletet 1 kg testtömegre, vagy anyagcsere-testtömegre vonatkoztatják a különböző fajtájú kutyák eltérő testtömege miatt.

Valamely táplálóanyag vagy hatóanyag minimális mennyiségét, amit a normális anyagcsere fenntartásához naponta fel kell venni, minimális napi szükségletnek nevezzük.

A javasolt napi ételadagot bármely állat részére úgy állapítjuk meg, hogy az a populáció minden egyes normális egyedének szükségletét fedezze.

A megállapított ételadag mennyisége fejlődési stádiumként (kölyök, adult) és testtömeg alapján kerül meghatározásra.

Energiaszükséglet

A kutya táplálóanyag-igényének kielégítésekor legfőbb szempont a kutyatáp, eledel energiatartalma, illetve a kutya energiaigényének kielégítése. A táplálék energiaforrásai a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok, és ezeknek a táplálóanyagoknak a fejadagokban lévő mennyisége határozza meg annak energiatartalmát.

Egyéb állatokhoz hasonlóan a kutya sem tudja a táplálék teljes energiatartalmát hasznosítani, így az emészthető, illetve metabolizálható energiatartalmat kell leginkább figyelembe venni.

Az alábbi táblázatban iránymutatásként foglaltuk össze a kutya napi tápanyagszükségletét 1 kg testtömegre vonatkoztatva (NRC, 1974)

1. számú táblázat: Kutya napi tápanyagszükséglete 1 kg testtömegre vonatkoztatva

	Kifejlett kutyák életfenntartó energiaszükséglete	Növekedésben lévő kutyakölyök szükséglete
Fehérje	4,8	9,6
Zsír	1,1	2,2
Linolsav	0,22	0,44
Kalcium, mg	242	484
Foszfor, mg	198	396
Kálium, mg	132	264
NaCl, mg	242	484
Magnézium, mg	8,8	17,6
Vas, mg	1,32	2,64
Réz, mg	0,16	0,32
Mangán, mg	0,11	0,22
Cink, mg	1,1	2,2
Jód, mg	0,032	0,068
Szelén, mg	2,42	4,84
A-vitamin, NE	118	228
D-vitamin, NE	11	22
E-vitamin, NE	1,1	2,2
Tiamin, µg	22	44
Ribaflavin µg	48	96

Angliában a kedvtelésből tartott állatok táplálkozásával és táplálásával foglalkozó intézet (WCPN) munkatársai az in vivo (élő állaton) mért emészthető energiatartalom értékeinek a különböző faktorok felhasználásával megállapított metabolizálható energiaértékkel történt összehasonlítása alapján kimutatták, hogy az NRC által adott értékek jól közelítik a kutyáknak az ismertebb kereskedelmi forgalomban kapható tápok által garantált energiaellátását.

A felnőtt kutya életfenntartása naponta $550 \text{ kJ/W}^{0,75}$ metabolizálható energiát igényel, csekély mozgás mellett $15\text{-}25^\circ\text{C}$ környezetben. A fejlődésben lévő kölyökkutyáknak kb. kétszeres a napi energiaszükségletük. Hideg környezetben a napi energiaszükséglet szintén növekszik.

A legtöbb, így az általunk is vásárolt, kereskedelmi forgalomban kapható teljes értékű kutyatáp $14\text{-}17 \text{ MJ/kg}$ metabolizálható energiatartalmú.

A kutya napi tápadagját a gyártó előírásai alapján testtömeg index alapján határozzuk meg, és adagoljuk. Az egyedi adagolás azonban leginkább csak a karanténban, illetve az elkülönített kennelekben biztosítható. A kifutós részben a kutyák folyamatos megfigyelésével követjük nyomon az egyes kutyák megfelelő tápanyagellátását.

Az állatok etetésére száraz (préselt) tápok, illetve hőkezelt állati eredetű „hulladékot” (211/213-4/2007. számú határozat alapján) használunk.

A száraz és nedves ételek, tápok kombinálásával a kutyák megfelelő energia és táplálóanyag – tartalom iránti igénye fedezhető.

Az alábbiakban foglaltuk össze a kereskedelmi forgalomban kapható standard tápok összetételét (csomagoláson feltüntetett információk alapján).

	Protein	Zsír	Rost	Hamu	Ca	P	Na	Mg	K	A	D	E	Biotin	MJ
Igény	22	5,5			1,1	0,9	0,7	0,1		1400	600	44		13
Ssniff Hd-H	22	5,5	4,8	7,2	1,2	1	0,4	0,2	1	17000	1000	200	500	12,9
Pedigree complet	20	10	3	6						10000	1000	150	1700	13,9
Purina DOGCHOW	23	10	3,5	8	1,5	1	0,4			20000	500	40		
Chappi	15	8	3							5000	500			13,6
Frolic	17	9	3	10						5000	400			
Porcijó	16,5	8,2	2,2		1,3	0,8	0,7			6400	640	40		
Purina Darling	18	6	3,5	7,5	1,3	1				5000	500	50		
Eukanuba junior large	26	14	2,5	6	0,8	0,8				15000	920			

A-,D-vitaminok
E-,B1-,B2-,B6-vitaminok
B12-,Biotin vitaminok

NE-ben
mg-ban
ug-ban vannak

IV. 2. Etetési forma

Az ebrendészeti telepen az állatok etetése külön tálból történik (fémátlat használva a rágás miatti állandó cserék elkerülése érdekében).

Etetés gyakorisága:

Adult, felnőtt egyedeknél a kutya élettani sajátosságainak megfelelően – elkerülvén a különböző emésztési problémák kialakulását – minden nap naponta egyszer (12⁰⁰-14⁰⁰) történik. Felnőtt egyedek által elfogyasztott ételmennyiség naponta ¼-1 kg (testtömegtől függően).

Kölyökkutyák etetése az alábbi program szerint történik:

Ellést követő négy hétben – természetes módon, az anyaállattal egy kennelben elhelyezve szukatejjel táplálva.

Négy hetes kórtól kezdjük el a tápok adását (vízben beáztatott táppal).

7-8 hetes kor jelenti az elválasztási kort, melytől kezdődően áttérünk a táppal történő etetésre. Naponta négy alkalommal kerül sor a tápok kiosztására, az egyszeri alkalommal megetetett mennyiség (a kutyák méreteihez, fajtájához igazodóan) 50-110 gramm /adagok kimérésére műanyag mérőpoharakat használunk/.

Az egyszeri ételadagokat fokozatosan növeljük, de kb. 14-16 hetes korban már elkezdjük csökkenteni az étkezések számát.

Hat hónapos korban a kölyök által elfogyasztott mennyiség $\frac{1}{4}$ - $\frac{3}{4}$ kg (napi kétszeri étkezésre).

IV. 3. Itatás rendszere

A víz minden táplálás alapja.

Az állatok megfelelő tisztaságú, csíramentes itatóvízzel való ellátását a vezetékes ivóvíz hálózatról biztosítjuk. Napközben több alkalommal kerül sor az itatóedények feltöltésére (különösen nyári melegben, amikor a napi középhőmérséklet a 25 °C értéket meghaladja). A kutyák rendszeres napi felügyelete mellett biztosítható a folyamatos vízutánpótlás.

A kutyák átlagos vízszükséglete 35-50 ml/testtömeg kg. A kistestű kutyáknak relatív több folyadékra van szüksége, mint nagyobb testű társaiknak. (pl. egy 5 kg-os kutya napi átlagos vízszükséglete kb. 250 ml, míg egy 50 kg-osnak kb. 2000 ml).

V. Megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás

Az ebrendészeti tevékenység üzemeltetésének mind humán-, mind állategészségügyi kockázatát minimális szintre kívánjuk csökkenteni, melynek érdekében minden a telepre beszállított egyed állatorvosi vizsgálaton esik át.

A beteg, illetve betegség tüneteit mutató, legyengült egyedeket külön karantén részben helyezünk el, kizárva az egészséges állatokkal történő érintkezés bármely formáját, járványos megbetegedések falkán belül történő kialakulását.

A karantén további időtartamáról, valamint a beteg állatok sorsáról állatorvos dönt. A folyamatos állatorvosi ellátás biztosítása érdekében dr. Ottmár György állatorvossal kötött a KMA szerződést ezen feladat elvégzésére.

Az egészséges egyedeket élettani adottságaira tekintettel etetjük, megfelelő elhelyezésükről, és állapotuk rendszeres nyomon követéséről gondoskodva.

V. 1. Ektoparaziták elleni védekezés

A kutyák legjellemzőbb külső parazitái az alábbiak:

- atkák
- bolhák
- tetvek.

Az ektoparaziták elleni védekezés érdekében legalább havi kétszeri rendszerességgel kerítünk sor a kutyák fekhelyeinek, illetve a kutyáknak aerosollal, bolhaporral történő beszórása.

V. 1. 1. Atkák, kullancsok

A kutyák leginkább tél végén és az őszi beköszöntével vannak kitéve a kullancscsípésnek, valamint a kullancsok által terjesztett vírusfertőzésnek.

A kullancsok az atkák fajának egyik alrendjébe tartoznak. Számos fajtájuk ismert, hazánkban kb. 25 féle található meg. Méretük 3-6 mm hosszú. Az élősködő a gazdaállatba kapaszkodik, így válik vérszívójává. A kullancs leválik gazdájáról, ha teleszívta magát.

A kullancscsípés által terjesztett agyvelőgyulladás következménye lehet hosszantartó fejfájás, szellemi leépülés és részleges bénulás. Ritkán a súlyos megbetegedés halálos kimenetű is lehet. Kutyák esetében jellemző diagnosztizálható tünet a bágyadság. Egyértelműen kullancscsípésre utaló tünet, ha az állat vizelete elsötétül.

Hatékony védelmet a kullancs elterjedésének megelőzése jelenti, mely kiemelt fontosságú az erdőterület közelsége miatt.

V. 1. 2. Bolhák

A bolhák köztes gazdái a kutyák más élősködőinek is – pl. bélféreg –, ingerlik a bőrt. Amikor a bolha csíp nyálát fecskendez a sebbe, hogy míg szívja meg ne alvadjon a vér. A nyálában lévő vegyi anyagok sokszor allergiát váltanak ki. Egyes különösen érzékeny kutyáknál a bolhanyál nagy kiterjedésű gyulladást kelt a hát bőrén – bolhaekcéma tünetei.

A bolhák életük nagy részét az állat környezetében töltik, és csak vérszívás céljából ugranak a kutyára.

Életciklus

A petékből megfelelő hőmérséklet esetén lárvák kelnek ki, melyek meghatározott idő után bebábozódnak és legkevesebb három hét alatt kifejllett, ivarérett bolhává alakulnak.

A fenti oknál fogva egyszeri akciószerű bolhairtással a telepen belül eredmény nem érhető el. Nem csupán a gazdaállaton, hanem az állat környezetében is ki kell irtani a bolhákat. Erre a célra külsőleg ható szereket használunk fel, melyek során az egyes egyedeket és azok helyeit is beporozzuk.

A rendszeres bolhairtással elkerülhetővé válik ezen külső élősködők túlzott elszaporodása és az endoparaziták (pl. bélférgek) elleni védelem.

V. 1. 3. Tetvek

A tetvek a kutyák kültakarójában élő szárnyatlan ektoparaziták, a rovarok legnagyobb olyan rendje, mely kizárólag állati parazita fajokból áll.

A tetvek életciklusának minden szakasza a gazdaegyeden zajlik, és több egymást követő generáció tagjai egyazon gazdaegyeden élhetnek. A fertőzés rendszerint a gazdaállatok közti közvetlen testi érintkezés kapcsán történik.

Tetvek ellen kialakított állati adaptációs mechanizmus az idegenek kiközösítésére kialakult adaptív magatartás, melyek részben a ragályos fertőzések elkerülését szolgálják (a tetvek elleni rendszeres küzdelem mellett a falkaszellem érvényesülése is biztosított).

Az állategészségügyi előírások teljesítéséhez szükséges pénzforrásokat részben az állatvédő szervezetekkel történő együttműködéssel kívánja az Üzemeltető biztosítani.

A közeljövőben hatékony PR és marketing programot kívánunk indítani állatgyógyászati termékeket előállító és forgalmazó cégekkel együttműködve, a különböző termékek reklámcélú felhasználása érdekében.

V. 2. Endoparaziták

Jellemző endoparaziták

A **belső paraziták** a kutya **galandférg**ei és **fonálférg**ei. Mindkét csoport a kutya bélsarával a környezetbe jutva vagy a kutya szőrére kerülve komoly fertőzési veszélyt jelent az ember számára.

A **nematodákat (fonálférgeket)** általában orsóférgeknek nevezik, mivel keresztmetszetük kör alakú. A férgek közül legnagyobb figyelmet érdemel a **Toxocara canis**. Ennek fertőzött petéket tartalmazó lárvája a kutya ürüléke révén, különösen a kisebb immunitással rendelkező gyermekekbe is bejuthat.

A fonálféreg fertőzöttség arány a kölyök kutyákban 80 %-ra tehető.

Ennek számos módja lehetséges:

- A mikroszkopikus nagyságú peték a külvilágra kerülve ragadósak, így könnyen rátapadhatnak a kutya szőrére és az ember kezére.

- A fertőző peték hosszú ideig életképesek maradnak a talajon, ellenállóak valamennyi fertőtlenítőszerrel, a hosszú ideig tartó faggal, sőt rövid ideig a forrásban lévő vízzel szemben is. Csak a beton kifutóknál használatos kertészeti lángszórók pusztítják el hatékonyan a petéket.

Az emberekben a lárvák kikelnek a petékből, keresztül hatolnak a bélfalon és szétterjednek a májban, vesékben, agyban vagy a szemben. Ezekben a szervekben maradva nem fejlődnek tovább és károsításuk gyakran a máj megnagyobbodásához, vaksághoz vagy görcsrohamhoz vezethet.

A *Toxocara canis* lárvák a szukában nem mindig alakulnak át kifejlett féregg

é, hanem alvó állapotban a testszövetekben maradnak. Amikor a szuka vemhes lesz, ezek a lárvák újra aktiválódnak, majd a vérárammal a placentába és a magzatba jutnak, és a magzat májába és tüdejébe helyezkednek el. A magzat megszületése után a kölyökkutya belébe vándorolnak és

itt fejlődnek ki féreggá. Ez a veleszületett fertőzés egy példája, a kölyökkutyák egy része már születéskor fertőzött az orsóféreg lárvákkal. Vagy más esetekben a szukában a vemhesség alatt újra aktiválódott lárvák ellés után az anyatejbe jutnak és így az újszülött kölyköket fertőzik. Mivel ezek az alvó lárvák nem a bélben tartózkodnak, a hagyományos gyógyszerekkel nem távolíthatók el. A *Toxocara canis* fertőzés zajos légzést és köhögést eredményez, különösen a szopós kölyköknél kéthetes életkor alatt. Az idősebb kölykök, háromhetes korig hányással kísért állandó hasmenésben szenvednek. A fertőzött kölykök kifejlett férgeket hányhatnak ki és növekedésük lelassul. Kifejlett kutyáknál a féregfertőzés klinikai jelei gyakorlatilag nem jelennek meg.

A **parazita *Linguatula serrata*** népies nevén nyelv-féreg, a kutya orrüregébe jutva orrfolyást, tüsszögést és légzési nehézséget eredményez. A parazita sebészeti távolítható el. Ritkán az embert is megfertőzheti.

A **belső parazitákhoz tartoznak a galandférgek:** Hosszú, lapos szalaghoz hasonló férgek, horgokkal és szívókákkal tapadnak a bélhez. Nagy részük emésztési zavarokat, végbél irritációkat és súlyvesztést idéz elő. A galandférgek hímnősek, szelvényekre osztott férgek, folyamatosan növekszenek. A fejtől legtávolabb a féreg végén lévő legöregebb szelvények petéket tartalmaznak, ezek egy vagy több alkalommal leválnak kettésével. A petéket, hogy életciklusukat be tudják fejezni, miután a kutya végbelén át az ürülékkel távoztak, be kell juttatni a megfelelő gazdaállatba vagy az emberbe. A gazdaállatba vagy az emberbe általában a szájon át kerülnek be a peték.

A ***Dipylidium caninum***, a legáltalánosabban előforduló galandféreg a kutyák egyharmadában megtalálható. A köztes gazda lehet a bolha vagy a tetű. A *Dipylidium caninum* 30-70 cm hosszúságú, jellegzetes uborkamag alakú, ízemből álló galandféreg. Scolexén négy szívóka van. Az utolsó petékkel telt ízemb vöröses színűek. Az ember is könnyen fertőződhet velük. Az állat fekvőhelyén a bélsorból kikerülő petetökeket a bolhalárvák veszik fel. A metamorfózis során a bolhalárvák bolhákká alakulásával az onkoszférás növekedése megindul, belőlük alakul ki a kriptocisztának nevezett galandféreg lárvája. A kutya szőrzetén, nyelvén szétharapott galandféreg lárvát tartalmazó bolhák lehetnek, melyek a kezünkre tapadhatnak, ha az ilyen kutyákat simogatjuk vagy ha a kutya a kezünket nyalogatja. Innen a lárvák könnyen bekerülhetnek az ember májába, majd a bélcsatornájaiba.

***Echinococcus granulosus* (rivókaféreg).** A kutyák háromötöd galandférgé 3-5 mm hosszú. Az *Echinococcus granulosus* petékből, ha azok valamilyen köztigazdába - pl. az

ember - kerülnek, az emésztőnedvek hatására kiszabadult onkoszférák vándorolni kezdenek. A portális rendszernél a májba jutnak. Egyrészük itt megtelepszik, másik részük pedig a szíven keresztül a tüdőbe vándorol. A tüdőben egyrészük ismét elakad. maradék részük azonban a nagyvérkörbe jut, különböző szervekhez sodródnak, ahol megtelepednek. Kifejlődésük nincs valamelyik szervhez kötve. A köztigazda bármelyik szervében megtalálják fejlődésük feltételeit. Kártételük súlyossága attól függ, milyen szervben telepsznek meg. A szívben megtelepedett echinococcusok szívrepedést és hirtelen elvérzést okozhatnak; a csontokban (csigolyákban stb.) megtelepedett hólyagok sorvasztó hatása miatt a csontok törékenyebbek, aminek nagyobb igénybevételénél rendszerint csonttörés a következménye.

Az Echinococcus lárvája az emberben mint köztigazdában is megtelepedhet, és igen komoly következményekkel járó megbetegedést okozhat. Az Echinococcus-ízek, peték a szőrzetre tapadhatnak, ezeket a kutya onnan lenyalhatja és bolhászkodás közben különböző testtájak szőrzetére tapaszthatja. Innen, esetleg a kutya nyelvéről, a peték könnyen rákerülhetnek az ember kezére, sőt a higiéniai követelmények elmulasztása miatt, szájon át könnyen az ember bélcsatornájába is eljuthatnak. Az emésztőnedvek hatására megnyílt peteburokból az onkoszférák kiszabadulnak és elkezdik vándorlásukat. A májba jutva rendszerint meg is telepsznek, s rosszindulatú, igen komoly következményekkel járó májmegbetegedést okoznak. Az echinococcus tömlő jelenlétét röntgennel is meg tudják állapítani. Erre való tekintettel, főleg ahol gyermekek vannak, a kutyák Echinococcus fertőzöttségének megállapítására fokozott figyelmet kell fordítani. A fertőzés Magyarországon meglehetősen gyakran előfordul.

Az Echinococcus (rivókaféreg) okozta ciszták jelenleg embereknél csak sebészetileg kezelhetők, a fertőzés halálos kimenetelű is lehet.

Ritkán fertőződhet az ember a kutya egyéb galandférgével mint a **Taenia (kergeféreg) fajok, Spirometra, Diphylobothrium (orsógiliszta)**.

Endoparaziták elterjedésének megelőzése

A férgek egyedeken belüli és egyedek közötti elszaporodásának megakadályozása érdekében állatvédő civil szervezetekkel együttműködve gondoskodunk a telepre bekerülő kutyák féregtelenítéséről (stratégiai féregtelenítési program).

Megelőzésnek hatékony részét képezi az állatok székletek rendszeres, napi gyakorisággal történő összetakarítása is.

A befogott állatok által terjesztett zoonózisok közül a humán-egészségügyi szempontból is veszélyes zoonózist, a veszettséget kell kiemelnünk.

Teendő veszettség vírusával fertőzött állat elhelyezése kapcsán:

Veszettség gyanús egyedeket az elkülönítőben kell elhelyezni, gondozásuk során kiemelt figyelemmel kell eljárni. Az ilyen fertőzés gyanús kutyák az elkülönítő, karanténban kerülnek leoltásukig elhelyezésre.

V. 3. Teendő kutyaharapás esetén

1. Azonnali sebkezelés

Kutyaharapás esetén a sebet azonnal meg kell tisztítani szappannal vagy detergenssel és alaposan ki kell öblíteni vízzel. Ezt követően alkohol (40-70 %) jódtinktúra, vizes jóddoldat vagy egy kvaterner ammóniumbázis 0,1 %-os oldatának valamelyikét kell alkalmazni. A szappannal végzett sebtisztítás után a szappant alaposan el kell távolítani az ammóniumbázis alkalmazása előtt, hogy annak hatását ne semlegesítsék.

2. Tetanusz elleni védelem

A tetanusz elleni védettséget biztosítani kell.

A további sebkezelésről üzemorvosi szolgálat gondoskodik. Valamennyi oltás beadását az oltást végző orvos köteles igazolni.

VI. Karantén módja, ideje és az elkülönítés előírásait

Az ebrendészeti telepre beszállított kutyák egészségügyi állapotát állatorvos ellenőrzi.

A betegség jeleit mutató egyedek orvosi vizsgálatára lehetőleg azonnal (állatorvos rendelőbe történő szállítással) sort kerítünk.

A beteg egyedek kezelésére, elhelyezésére vonatkozóan az állatorvos utasításai vannak érvényben.

Menthetetlen egyedek elaltatásáról az állatorvos gondoskodik.

A kezelést, állatorvosi ellátást igénylő, illetve agresszív állatok a külön kialakított karanténba kerülnek.

A karanténban elhelyezett állatok érintkezése a zárt oldalfalaknak köszönhetően (falkán belüli epidémia kialakulása) kizárható.

A karantén időtartamát az állatorvos határozza meg.

VII. Állatok szökésének megakadályozása, veszélyes egyedek tartásának szabályai

Az állatmenhelyen megőrzött kutyák szökésének megakadályozása érdekében biztonsági előírások és ezzel egyidejűleg biztonsági berendezések kerültek bevezetésre, illetve kialakításra.

A karantén, valamint az egyes kennelek egyedi, zárható ajtóval kerültek kialakításra. Az állatok ki- és betelepítése során a létesítményeket körülvéő kerítés kapujának zárva tartásáról gondoskodni kell. Az állatoknak a szükségleteihez igazodó mozgástér biztosított.

A kifutós rész magasítóval ellátott kerítéssel került kialakításra, mely megakadályozza az egyedek kiszabadulását.

A karantén, az egyes kennelek, valamint a kifutós rész ajtajainak nyitását-zárását csak a telepi dolgozók, illetve az állatok begyűjtését végző gyepmester végezheti.

A telepre látogató személyek számára tilos a kennelek bejáratának kinyitása!

Agresszív veszélyes egyedek tartása

Az agresszivitás a kutyák jellemzője, melynek a falkán belüli rangsor kialakításában van funkciója.

Az agresszió abban az esetben jelent problémát, ha az kóros mértékű (főként, ha emberre irányul), ezen egyedek örökbeadása biztonsági okokra tekintettel nehezen képzelhető

el, különösen olyan családok felé, ahol kisebb korú gyerekek vannak (az ember elleni kutya támadások kitüntetett személyei főként a gyermekek).

A kutyák kóros agresszivitásának számos oka lehet. Örökletes hajlam, szervi megbetegedések és környezeti hatások is kiválthatják. Ezek diagnosztizálása nehéz feladat.

A kóros agresszivitás visszatérő jellegű és nyilvánvaló tünetekkel jár. Alapformái az offenzív vagy támadó és a defenzív vagy védekező agresszivitás, mely utóbbi lehet aktív és passzív is. Ezekről eltér a ragadozó agresszivitás, mert annak eredeti célja a táplálékszerzés.

A jellemző viselkedési tünetek a szőr borzolása, a merev figyelés, a fogvicsorítás, a morgás és a harapás. Az agresszivitás alapformái bizonyos viselkedési jelek alapján egymástól elkülöníthetők:

1. Az **offenzív** agresszió során a kutya a fejét és a farkát magasan tartja, füleit hegyezi, szájzugai előrehúzottak és az áldozat szemébe néz. Testtartása, járása merev, feszes, morog és a fogát vicsorítja.
2. A **defenzív** agresszió esetében a kutya a fejét lesunyja, a pupillái tágak, fülét hátracsapja, szájzugait hátrahúzza (szinte vigyorog). Igyekszik meglapulni, remeg és a farkát a hátulsó lábai közé csapja.
3. A **ragadozó** kutya meglapulva les, nyálzik, farkát csapkodja, lassú léptekkel lopakodva közeledik, majd hirtelen, hang nélkül rohanja le az áldozatát.

A kórosan agresszív egyedek az elkülönítőbe kerülnek elhelyezésre (egymástól zárt oldalfalakkal elválasztva), megakadályozva ezáltal a fajtársakkal való összeverekedést, más kutyák megsebzését.

Ezen veszélyes kutyák esetében az elkülönítő rácsára ki kell függeszteni a „Veszélyes!” táblát, illetve az agresszivitás tényét a belső dokumentumokon fel kell tüntetni.

Ezen egyedek kizárólag a saját gazdáknak adhatók ki.

VIII. Az ebrendészeti telep dokumentációs rendszere

Az ebrendészeti telepre beszállított egyedekről pontos nyilvántartás készül.

Az állatmenhelyen történő elhelyezés, befogadás során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre, a kutyabefogási úrlapon:

-begyűjtött kutya neme, színe, jellemző küllemi tulajdonságok, becsült kora, becsült súlya

-begyűjtés helye

-begyűjtés időpontja

-begyűjtés oka(különösen fontos, olyan esetekben, amikor az állat beszállítására ember elleni támadás, harapás miatt került sor

- bejelentő neve, begyűjtésnél jelen levő egyéb személy

- chip száma

- ha van tulajdonos, a tulajdonos adatainak rögzítése

- karantén lejárati időpontja

-esetleges altatás időpontja

Az ebrendészeti telepre történő belépés során az adatok rögzítését a kutya ellátásával megbízott személy végzi, a betelepítés, elhelyezés helyéről ő dönt a kutya egészségi állapotára, viselkedésbeli habitusára tekintettel.

Az ebbefogás nyomtatványai:

-ebbefogási űrlap

- ebbefogás -közterületről -összesítő

- ebrendészeti telep -állati hulladék átvételi űrlap

IX. Állatok tartásának, gondozásának szabályai

Az állatok az ebrendészeti történő megőrzésének időtartama alatt folyamatosan gondoskodunk az „animal welfare” - állati „jólét” elfogadható szintjének megteremtéséről.

Mind az állatok betelepítése, mind a tartása (etetése, itatása, napi takarítása) során a lehető legkörülmények között igyekszünk figyelembe venni az egyes egyedek sajátos igényeit.

Kölyök kutyákat, szoptató és vemhes szukákat, valamint a beteg egyedek elkülönített elhelyezéséről gondoskodunk.

Az ellés előtt lévő szukákat külön helyezzük el a kennelekben, a kennelekben lévő kutyaólatokat elletőólatokká alakítjuk, faforgáccsal és textíliával béleljük ki. (A szennyezetté vált

forgács és textil eltávolításáról az ellést követő napon gondoskodunk. További kezelésük veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történik.)

Tömeges beszállításkor, amikor a telepen lévő egyedszám nem teszi lehetővé a zárható, kennelekben való elkülönített elhelyezést a kutyák mérete, habitusa alapján kerülnek kis létszámban (2-3 fős csoportokban) elhelyezésre. A közel azonos méret szerinti elhelyezéssel egységesebben biztosítható a kutyák kiegyensúlyozott táplálása.

A kutyák méret szerinti besorolása a telepen az alábbi:

- kis termetű kutyák (pl. foxterrier, spánielek, tascó, beagle stb. és ezek keveréke): súlyuk maximum 11,5 kg, marmagasságuk max. 28 cm

- közepes termetű kutyák (pl. corgi, bullterrier, berni pásztor, puli stb. és ezek keveréke): súlyuk 11,5-30 kg között van, marmagasságuk 38-68,5 cm

- nagy termetű kutyák(pl. boxer, szetterek, briard stb. és ezek keveréke): súlyuk 30-45 kg, marmagasságuk 53,5-70 cm

- óriás fajták (pl. masztiffok, komondor, bernáthegeyi stb. és ezek keveréke): súlyuk min. 45 kg (de lehet akár 70 kg is), marmagasságuk 68,5-86,5 cm.

Az egyedileg zárható kennelekben lehetőleg kis és közepes termetű kutyákat igyekszünk csoportosan elhelyezni (természetesen itt is kiemelt tekintettel az egyes egyedek habitusára, viselkedésére).

A lakosság által átadni kívánt, lemondott kutyák telepre történő befogadása csak abban az esetben biztosítható, ha elegendő férőhely áll rendelkezésre. Ezen kutyák átadásával egyidejűleg a szükséges eboltási bizonylatot is a telep üzemeltetője felé át kell nyújtani.

A lemondott kutyák befogadására csak térítés ellenében kerülhet sor.

Az állatok tartása, gondozása során olyan eszközöket nem használunk fel (sem a telepen belüli áthelyezéshez, sem takarításhoz, sem etetéshez) mely a kutyák sérülését okozzák.

A kutyák telepen belüli áthelyezését, elhelyezését az egyedek anatómiai, méretbeli sajátosságaihoz illeszkedő befogó eszközzel végezzük (mely kialakítását, működését tekintve megakadályozza az állatok fulladását, nyaki sérüléseinek kialakulását).

A telepen dolgozók, valamint a kutyák befogását végző ebrendész az állatokkal kíméletesen bánt, rendszeres, legalább évenkénti egyszeri állatvédelmi oktatásukra sor kerül (különös tekintettel a jogszabály-változásokra).

A működési szabályzat kidolgozása során figyelembe kívántuk venni azt a tényt is, hogy a megőrzött állatok számos betegséget okozó vírusok és baktériumok „gazdája” is egyben. A telepen megőrzött kutyák nagy része gazdátlan kóbor ebek közül kerül ki, amelyek feltételezhetően védőoltásban nem részesültek, illetve a kötelező védőoltás elmulasztása miatt kerültek oda.

A telepi munkák során, tekintettel a veszélyes üzem jellegére kellő körültekintéssel kell eljárni; általános előírás a kutyákkal való foglalkozás során az elvárható felelős munkavégzés.

Az ebrendészeti telepre csak kizárólag az állatgondozó engedélyével , és előzetes egyeztetés után lehet belépni, a belépő látogatók kötelesek az ott dolgozó személyek iránymutatásait figyelembe venni, és azt betartani. Az elkülönítő, karanténban elhelyezett egyedekhez benyúlni szigorúan tilos!

X. Tápok, eledlek tárolásának szabályai

A befogott állatok etetésére jelentős részben száraz, kereskedelmi forgalomban kapható kutyatápokot használunk.

A tápok a beszerzést követően zárható tároló helységben kerülnek elhelyezésre.

A tárolás módja kizárja a tápok minőségromlását.

Lejárt szavatosságú, valamilyen rendkívüli oknál fogva romlott állagú eledleket az állatok etetéséhez nem használunk fel.

Az önkormányzati intézményektől átvett konyhai, élelmiszer hulladékokat csak hőkezelést követően etetjük meg a kutyákkal.

Nyers, állati eredetű élelmiszerek felhasználása TILOS!

A tápok tárolására szolgáló helységben más anyagokat nem helyezünk el.

Az eledel raktározása során biztosítjuk a nedvességgel és élősdiekkel való érintkeződését.

Patkányirtásra évenkénti rendszerességgel kerül sor a telepen.

A patkányok a kutyákra igen veszélyesek, főleg a kisebb (6-12 hetes) kiskutyákra, mivel sok patkány a leptospirozis nevű betegséget hordozza, amely majdnem mindig halálos.

XI. Állati tetemek, állati hulladékok, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módja

Az ebrendészeti telep üzemeltetése hulladékok keletkezésével jár együtt.

A keletkező hulladékok egy része nem veszélyes, másik része veszélyes hulladék.

Hulladék HAK kódja	Hulladék megnevezése	Becsült éves menny. (kg)
Nem veszélyes hulladékok		
02 01 06	Állati ürülék, vizelet és trágya, elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)	400-500
02 02 03	Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok	1
Veszélyes hulladékok		
18 02 02	Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	800

Az ebrendészeti telep keletkező trágya és vizelet egy központi vízzáró betonburkolattal ellátott szennyvízgyűjtő aknába kerül. Az aknában összegyűlt hígtrágyát a Salgótarjáni Csatornamű Kft. szállítja el.

Fogyasztásra és feldolgozásra alkalmatlan anyagok kivételes esetekben keletkeznek, amikor az etetés céljából vásárolt tápok, takarmány kiegészítők az állatokkal nem megetethető minőségű válnak (normál üzemmenetre nem jellemző, melyet várható éves mennyisége is jelez). Ezeket a maradványokat a megrendelő elszállítja, ártalmatlanítja.

Az ebrendészeti telepen sajnálatos módon még legoptimálisabb esetben sem remélhető valamennyi befogott állat menhelyre kerülése, örökbe adása.

Ha a kutya egészségi állapota, antiszociális viselkedése indokolja az eutanáziát az állat leoltásáról az állatorvos dönt; az így keletkező állati tetemek és egyéb veszélyes állati eredetű hulladékok (pl. elletőolakból kikerülő faforgács, textil stb.) kezeléséről a 71/2003. FVM rendelet előírásainak megfelelően gondoskodni kell.

2007. évben kerül megvalósításra Salgótarján Térségi Hulladéklerakó telep területén KIOP pályázatból a központi állati hulladékbegyűjtő-átrakó állomás, mely biztosítja a keletkező állati hulladékok, állati tetemek jogszabályi követelményeket kielégítő kezelését.

Ezen telepen hűthető állati hulladéktárolóban történő átmeneti megőrzést követően az állati tetemek a SZATEV Rt. szikszói telepére kerülnek ártalmatlanítás céljából beszállításra.

Az állati tetemek szállítását a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Üzemeltetési Nonprofit Kft. meglévő begyűjtési és szállítási engedélye alapján végzi.

/Engedély száma: 27-006/2004. kiállító hatóság: Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás/.

XII. Állatok tartási helyeire, valamint a tárolóhelyek takarításának, tisztításának és fertőtlenítésének eszközei, anyagai és módja

A begyűjtött állatok elhelyezésére az alábbi létesítmények szolgálnak:

- elkülönítő, karantén épület
- fedett, falkaszerű elhelyezést biztosító kennelek.

Létesítmények telepítésének helye a műhely és a portaépület dél-keleti oldala. Az ebrendészeti telep körülkerítése biztosított.

Az állatok elhelyezésére úgy kerül sor, hogy védjük őket az időjárás kedvezőtlen hatásaitól.

A telep kialakításánál felhasznált anyagok az állatokkal közvetlen érintkezésbe kerülve ártalmatlanok és nem okoznak sérülést.

XII. 1. Elkülönítő, karantén épület

Kialakítása téglából épített

Férőhelyek száma: 2 db.

Egyedsűrűség: 1 db/férőhely.

Funkciója: beteg, kórosan agresszív állatok elhelyezésére, megőrzése.

Betelepítés rácsos ajtón keresztül.

A kennelek padozata betonburkolattal ellátott, amely alatt a vizelet, valamint a bélsár összegyűjtésére szolgáló betonozott tálca került kialakításra.

Épület ventilláció az ajtók felőli rácsos oldalfal felől biztosított, melynek anyaga 5 x 5 betonacél. Az egyes rekeszek további 3 oldalfala teljesen zárt, az állatok érintkezésének, összeharapásának elkerülése érdekében.

Belső komfortklíma fenntartását a szélcsendes oldalfal felőli rács, valamint a tető biztosítja.

XII. 2. fedett, falkaszerű elhelyezést biztosító kennel

Kialakítása: fedett, , kerítéssel zárt terület.

Férőhelyek száma: kb. 2 db.

Funkciója: vemhes és szoptatós szukák, kölyök-kutyák elhelyezése, agresszív, illetve legyengült a falkába beilleszkedni nem tudó egyedek elszállásolása.

Egyedsűrűség: 1-3 db egyed/férőhely

Betelepítés. Rácsos nyitható ajtón keresztül.

Felszereltség: kutyaól, etető és itatótálak , betonburkolattal.

Az egyes kennelek tisztíthatóságát a betonaljzat lejtése, hátsó vízelvezető folyóka felőli csőátvezetés biztosít. A bűzelzáróval ellátott csatornaszem, valamint a ketrecek hátsó oldalán kialakított zárt szennyvízelvezető csatorna(megfelelő lejtéssel kiépített betonaljzat mellett) biztosítja a szennyvíz eljutását a zárt rendszerbe.

Nyári időszakban a tűző napsütés elleni védelmet a kutyák számára biztosítani kell, mely a fedett részben elhelyezett kutyaólakban, illetve az mögötti árnyékos helyen megoldható.

Ventilláció a kennelek ajtaját alkotó betonacél. A jó szellőzés folytán kisebb a páralecsapódás és a nedvesedés. Valamennyi kennel fedett, melynek köszönhetően a kutyák a csapadéktól és az erős napsütéstől védettek. Az oldalfalak téglából készültek, mely megakadályozza a kutyák összeharapását.

A zárt oldalfalaknak köszönhetően a hőveszteség is , azaz nyáron hűvösebb, télen melegebb elhelyezést biztosít az állatok számára.

Az ellés előtt álló szuka kutyák számára a beszerzett kutyaólakban alakítjuk ki az elletőhelyeket, faforgáccsal és textíliával kibéelve.

A telepen felhasznált fertőtlenítőszeres jellemzően állategészségügyi céllal felhasznált anyagok, amelyek az állatok ekto- és endoparazitái elleni hatékony védelmet szolgálnak (stratégiai féregirtás, bolhairtás stb.).

XII.3. Fedett , falkaszerű elhelyezést biztosító kennel

Kialakítása: fedett, kerítéssel zárt terület.

Kennelek száma száma: 1,30x1,50 m kennel 9 db, 1,20x4,00 m 20 db

Egyedsűrűség: 1-3 db egyed /férőhely

Funkciója: telepre szállított, egészséges ,rangsorba beilleszkedni tudó állatok elhelyezése.

Nyári időszakban a tűző napsütés elleni védelmet biztosítani kell, mely fedett részben elhelyezett kutyaólakban megoldható. Amennyiben szükségessé válik Rachel háló kifeszítése javasolt.

Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények tisztítására napi rendszerességgel kerül sor. A betonozott aljzattal rendelkező elkülönítő és az egyedileg zárt kennelek tisztítása felgyülemlett, pangó vizelet és bélsár eltávolítása nedves permetezéssel, a vízi közműre való rácsatlakozásával történik. Az összegyűlt (illetve összegyűjtött) trágya és trágyalé) zárt, vízzáró betonburkolattal ellátott aknába kerül, melynek rendszeres kiürítésről a Megbízó gondoskodik.

A telepen felhasznált fertőtlenítőszeres jellemzően állategészségügyi céllal felhasznált anyagok, amelyek az állatok ekto-és endoparazitái elleni hatékony védelmet szolgálnak. (stratégiai féregirtás, bolhairtás stb.)

Állategészségügyi szempontból kiemelt jelentősége van az elkülönítő, karantén folyamatos fertőtlenítésének, különösen fertőző betegségben szenvedő állat elhelyezését követően (ezen állatok kezeléséről, esetleges leoltásáról az állatorvos dönt).

Alkalmazott fertőtlenítőszer: Neomagnol vizes oldata.

További, különleges fertőtlenítést az állatorvos vonatkozó előírásai szerint végzünk. Járványveszélyes időszakban állatorvosi utasításra használt fertőtlenítőszer alapos felületi lemosásáról gondoskodni kell, az esetleges tócsák megszüntetését biztosítani kell, mivel azok veszélyesek a kutyákra, kivált a kölyökkorúakra.

Évente egy alkalommal kerül sor a telep részletes és teljes körű tisztítás és fertőtlenítés.

Járványveszélyes időszakban a telepre gépjármű kizárólag a kerékmosó műtárgyon áthajtva léphet be.

A takarításhoz használt eszközök (lapát, seprű stb.) az elkülönítő, karantén épület mellett kerülnek elhelyezésre. Tisztításuk a férőhelyek tisztítását követően naponta történik.

Tisztítás, takarítás eszköz-szükséglete a szabad kereskedelmi forgalomban kapható kézi eszközök. Lapát, seprő, vödör:-itatós és külön ganajos, gumikesztyű, slag, magas nyomású sterimob

A kifutós, egyedileg zárt kutyakennelek mögött került kialakításra a tisztításhoz szükséges vizet biztosító vízcsap.

A tisztításhoz használt anyagok a portaépület belső raktárába kerülnek elhelyezésre.

A fertőtlenítéshez használt anyagok a hulladéklerakó telep portaépületének belső raktárhelységében találhatók.

A fertőtlenítőszerbiztonsági adatlapjai a „Veszélyes anyagok” dossziében kerül lefűzésre. A felhasznált veszélyes anyagokról pontos nyilvántartást vezetünk (veszélyes anyag-felhasználási napló).

A fertőtlenítés azonban humán-egészségügyi szempontból is kiemelt fontosságú a kutyák rendszeres gondozását végző alkalmazottak vonatkozásában.

A kutyák ellátását végző alkalmazott kézmosására Neomagnol oldat szolgál, melyet naponta készít el a portaépület szociális helységében.

A dolgozó számára fekete-fehér öltöző biztosított szintén a központi portaépület szociális helységében.